



第25卷

第3期

ISSN 0411-8421



ZHEJIANG JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

浙江中医杂志



浙江中医杂志

(第二十五卷第三期总二二八期)

一九九〇年三月十六日

目 录

【名医医疗特色】

- 乳岩与乳癖 何任 97
【临床经验集萃】
费氏鹅梨汤治疗60例肺气肿疗效观察 蒋正文等 99
辨证治疗慢性肺心病急性发作期69例 赵福英等 100
针刺加贴敷治疗支气管哮喘与慢性支气管炎 陈家鼎 101
活血化瘀为主治疗小儿支气管哮喘 50例 姚惠陵 102
止喘灵治疗小儿毛细支气管炎50例 李富汉 103
全蝎鸡蛋治百日咳74例 王保贤等 114
四虫汤治疗慢性荨麻疹100例 纪钩等 104
中西医结合治疗白细胞减少症和粒细胞缺乏症84例 周维顺等 105
中西医结合治疗耳带状疱疹综合征 陈仁华 106
佛手通脉汤治疗深静脉血栓形成 夏永潮 106
胎儿无皮肤症妊娠期防治 王相勤 107
小儿眨眼病从肝论治 梅和平 107
补益法治疗五官科疾病经验举隅 承忠委等 108
益气聪明汤治分泌性中耳炎152例 丁正琪等 109
咽后壁点刺放血为主治疗咽异感症 180例 周景伟 110
利咽冲剂治慢性咽炎135例 马建伟等 110
罗应成治疗眼疾重证经验介绍 罗文斌 111
复方补骨脂酊等治疗尖锐湿疣36例 阎树文等 113
牙痛灵外用治牙痛 胡金曼等 113
当归芍药散治中心性视网膜脉络膜炎 蒋运祥 114
逍遥散治疗皮肤病经验 魏道雷 114
活血利湿法治结节性痒疹 楼丽华等 114
辨证治疗慢性骨膜炎 雍履平 115

中药煎液浸泡治疗糖尿病性趾端坏死20例

- 朱夏良 104
猪莶草为主治疗扁平疣 黄万顺 115
文蛤膏外敷治痈疽肺肿 张义等 109
藿香正气水致心动过速4例 周津通等 112
中毒性耳聋治验1例 马荫笃 138
益气聪明汤治疗链霉素反应19例 乾维德 133

【难症释疑】

中医治疗红斑狼疮的探讨

【医家杂谈】

- 外痈内治话消瘀 《医林改错》中小方也是宝

【新百草镜】

- 虎耳草治疗中耳炎 一物多用珍珠菜
大剂量皂角刺治疗无汗症

【方药运用】

- 经方治验2则 小柴胡汤治奇症
李古松外用白降丹经验

【文献综述】

中医治疗小儿肺炎近况

【针灸聚英】

- 针灸治疗阳痿概述 针刺治疗小儿下肢瘫痪
针刺治疗垂腕症 针刺大陵治手痉挛
耳针治呃逆 指压少商治呃逆
针刺人中治呃逆

【医史新获】

- 小儿三关指纹诊法之历史沿革 虞天民年谱(续)

【古籍研讨】

李东垣《活法机要》学术思想浅探

【古籍珍本】

浙江名医传略

【医苑之窗】

- 活血化瘀药传统分类法获得验证 中医“证”的形态学生化学依据 有关人体的一组数字“咳嗽”——心脏病人的自救术 柏杨看中医药 黄芪治疗病毒性心肌炎有良效 服药禁忌 针灸保胎治不孕 寒食散治病有功

142

王闻卿 125

欧春 127

吕中 128

胡金曼 129

顾铭康 129

沈占尧 129

黄云 130

刘建萍 130

李加坤 144

夏承义等 131

黎祖琼 134

张华英 136

张荣伟 136

何有水 136

张雪朝 136

周建平 136

李兆苓 136

吴少祯 137

冯汉龙 137

曹炳章 117

针刺治疗小儿下肢瘫痪

张华英

笔者用针刺治疗小儿下肢瘫痪，效果良好。如治宋姓男儿，3岁，先轻度咳嗽，纳差，精神委靡，次晨发热自消，但左腿痿软不能站立，经诊断为小儿麻痹症，遂来针灸治疗。令患儿侧卧（亦可端坐）。取穴为3组，每日选其中2组，逐日交替针刺。3组穴：一组为仆参穴快速进针，至皮下，然后针尖向上，边捻转边进针，经昆仑、跗阳，直抵飞扬；一针透4穴。一组为承山穴快速进针，向上沿腓肠肌二筋之间，边捻转边进针。经承筋、合阳，直透委中穴；亦一针透4穴。一组为阳陵泉快速进针至皮下，边捻转边进针，经阳交、光明，直透阳辅，一针透4穴。每次留针30分钟，每隔10分钟捻针1次。经治20次，行走如常。另治13例，男4例，女9例，年龄均在3岁以下，其中小儿麻痹症8例，肌肉注射损伤神经所致瘫痪5例。经针刺15~45次后12例行走如常，尚有1例针刺60次后走路略跛。

针刺治疗垂腕症

张荣伟

均由睡眠时前臂枕于头下，损伤肱骨下端而致，病程最长3月，最短25天。治疗方法为循经取穴，浅刺少留，运用补法；结合温针及电针，配以活动手指。经治16~53次，均获痊愈。如治向X，男，31岁。春节饮酒过量，睡路边凉亭中，右前臂放头下，醒后觉右手发麻，且腕下垂，拇指外展与伸直无力。治取手三里、三阳络、外关、八邪，温针刺，补法，日一次；同时嘱作功能锻炼。5次后症状缓解。又作电针治疗手三里、外关两穴。8次后右手伸腕展指自如，唯肌力稍差，仍以温针治疗，3次后恢复正常。

针刺大陵治手痉挛

何有水

30余年来，共治疗25例，无论该症由何病合并发作或单纯发作，经治1次，均能使痉挛迅速缓解。治疗方法是：取患侧大陵穴，仰掌舒腕取穴，针刺1~3分深，深刺反无效。有麻感后，不要再移动针尖，原处点针，以加大针感传导。取穴准确时，能使五指俱有麻感，且传至指尖，手痉挛大多在此时开始缓解，手指由紧握变为舒展。

手痉挛症，是指手呈握拳状，或呈鸡爪样抽搐。笔者临床发现，针刺大陵治该症有特效。

耳针治呃逆

张雪朝

笔者治呃逆，取耳针膈、胃为主穴，配以交感、神门。若呃声长而无力，舌淡脉弱，属虚证，宜针刺弱而留针久，也可用王不留行子贴压耳穴，患者每日按压5次，每次10分钟。若呃声短而有力，舌红脉弦，属实证，宜针刺强而不留针。治疗21例，年龄17~60岁，呃逆持续或间断发作1周至月余，轻者刺1次愈，重者刺5次而愈。

指压少商治呃逆

周建平

笔者自1985年以来，在从事麻醉工作中，应用针灸知识，指压少商治疗西医外科手术中和手术后出现的呃逆症126例，104例有效，22例无效。按压方法是用拇指头压患者少商穴，食指帮助捏压。按压次数不等，一般以呃止为度。

针刺人中治呃逆

李兆苓

笔者治呃逆，常嘱患者仰卧或端坐，局部消毒后用毫针刺人中穴，从下向上斜刺约8分，2分钟运针一次，留针10分钟。从1983年4月至1989年6月，以此治疗40例，其中男23例，女17例，年龄12~76岁，起病时间4~72小时，呃逆次数5~20次/分。脑梗塞伴呃逆5例，癔病伴呃逆4例，胃癌伴呃逆2例，由饮食不当，生气及受寒所致29例。针1次而愈35例，针2次而愈5例。